



Herstelplan Achillespees & Hak | Morbus Sever | Jeugdvoetbal

vv Bennekom · Sportverzorging Jeugd · Programma 4–6 weken · Leeftijd 8–14 jaar

Wat zijn achillespees- en hakklachten tijdens de groei?

Pijnklachten aan de achillespees en hak bij groeiende jeugdvoetballers worden het vaakst veroorzaakt door de ziekte van Sever (Morbus Sever), ook wel calcaneum-apofysitis genoemd. Hierbij ontstaat irritatie op de groeischijf van het hielbeen (calcaneus) — het punt waar de achillespees en de plantaire fascia aanhechten. Door de snelle groei van het bot tijdens de groeisput wordt de achillespees tijdelijk relatief te kort, waardoor de trekkracht op de groeischijf toeneemt. Lopen, springen en schieten verergeren de klachten.

Naast Morbus Sever kan ook de achillespees zelf geïrriteerd raken (achillestendinopathie), met name op de aanhechting aan het hielbeen. Beide aandoeningen worden in dit programma gecombineerd behandeld, aangezien de aanpak grotendeels overeenkomt.

 Locatie Hielbeen (calcaneus) — aanhechting achillespees en plantaire fascia	 Leeftijd Jongens 10–14 jr Meisjes 8–12 jr (groeisput)	 Kenmerken Pijn bij/achter de hak Stijfheid ochtend & na rust Drukpijn hielbeen
---	--	--

Vergelijking groeigerelateerde knieklachten en hakklachten

Aandoening	Locatie	Leeftijdspiek	Kernbehandeling
Morbus Sever	Hielbeen / achillespees aanhechting	8–14 jr	Hiellift, kuitstretching, excentrisch
Osgood-Schlatter	Tuberositas tibiae (scheenbeen)	10–15 jr	Quadricepsoefeningen, kniebandage
Sinding-Larsen	Onderpool knieschijf	9–14 jr	Excentrische squat, patellabandage

Doelstellingen van het herstelprogramma

- Pijn en drukgevoeligheid op het hielbeen verminderen
- Achillespees en kuitmusculatuur verlengen en ontspannen (relatieve verkorting door groei aanpakken)
- Excentrische kracht van de kuitspieren opbouwen ter ontlasting van de achillespees-aanhechting
- Voetgewelf en looppatroon optimaliseren
- Geleidelijke opbouw naar voetbalspecifieke belasting (rennen, springen, schieten)

- Voorkomen van terugval na terugkeer in het team

Algemene richtlijnen

- **Stop of pas aan bij pijn >3/10. Lichte hakpijn bij aanvang activiteit (≤2/10) die verdwijnt tijdens warming-up is acceptabel.:** Pijn als graadmeter
- **Gebruik een hiellift (5–10 mm) in beide schoenen — dit ontlast de achillespees direct en vermindert trekkracht op de groeischijf.:** Hiellift / hielkussentje
- **15 min na elke training/activiteit — nooit direct op de huid.:** IJstherapie
- **Goede demping, stevige hielgreep en voldoende hakhoging. Controleer slijtageprofiel zool.:** Schoeisel
- **Vermijd hardlopen op de hak (overmatig hielstrike) — licht middelvoets lopen verdeelt de belasting beter.:** Looppatroon
- **Speler, ouder, trainer en sportverzorger blijven actief betrokken bij voortgang en belasting.:** Communicatie

Faseoverzicht programma 4–6 weken

Fase	Periode	Doel	Belasting	Voetbal
Fase 1	Week 1	Pijncontrole & ontlasting hak	Relatieve rust	Niet
Fase 2	Week 1–2	Kuitstretching & lichte kracht	Laag, pijnvrij	Niet
Fase 3	Week 2–3	Excentrische krachtsopbouw	Gematigd, <3/10	Lichte passing
Fase 4	Week 3–4	Functioneel loopherstel	Matig-hoog	Passing + loopdrills
Fase 5	Week 4–5	Voetbalspecifiek	Hoog, deeltraining	Gedeeltelijke training
Fase 6	Week 5–6	Volledige terugkeer	Wedstrijdniveau	Volledig

Uitgewerkt weekprogramma

Fase 1 Pijncontrole & ontlasting hak — Week 1	
Doel	Irritatie van de groeischijf en achillespees verminderen; directe belasting staken.
Oefeningen	• Hiellift (5–10 mm) in beide schoenen — dag en nacht aanhouden • IJstherapie: 3–4x per dag 15 min na activiteit of bij hakpijn • Kuitstretching (m. gastrocnemius): knie gestrekt, 3x 45 sec per been • Kuitstretching (m. soleus): knie licht gebogen, 3x 45 sec per been • Plantaire fascia massage: tennisbal of flesje rollen onder de voetzool, 2x 2 min • Rustig fietsen (geen hieldruk): 10–15 min als pijnvrij alternatief • Wandelen normaal toegestaan — vermijd rennen en springen
Aandachtspunten	• Geen rennen, springen of intensief voetballen bij pijn >3/10 • Hiellift in BEIDE schoenen — ongelijke hoogte veroorzaakt bekkenscheefstand • Controleer schoolschoenen en vrije tijdsschoenen: ook daarin hiellift plaatsen • Ouders informeren: ook thuis de hiellift dragen

Fase 2 | Kuitstretching & lichte krachtsopbouw — Week 1–2

Doel	Achillespees geleidelijk oprekken, doorbloeding stimuleren, lichte spieractivatie.
Oefeningen	• Kuitstretching beide spieren: 4x per dag, 3x 45 sec per been (ook ochtend voor opstaan) • Plantaire fascia rek: teen naar achteren trekken (groot-teen extensie), 3x 20 sec • Bilateraal kuitverhef (heel raise) op vlak: 3x 20 herh. — langzaam omhoog en neer • Towel curl: handdoek optrekken met tenen, 3x 15 herh. per voet • Balans op één been (stabiel oppervlak): 3x 30 sec per been • Fietsen: opbouwen naar 20 min, normaal zadelhoogte • Zwemmen (geen schoolslag): pijnvrij cardiovasculair alternatief
Aandachtspunten	• Kuitverhef: als bilateraal pijnvrij → opbouwen naar unilateraal in fase 3 • Rek voelen in kuit/achillespees is normaal — pijn in de hak is een stopsignaal • Evaluer pijnscore begin week 2: >3/10 in rust → fase 1 verlengen

Fase 3 | Excentrische krachtopbouw achillespees — Week 2–3

Doel	Achillespeesbelastbaarheid opbouwen via excentrische oefeningen — de bewezen kerninterventie.
Oefeningen	• Excentrische heel raise op traptree: bilateraal omhoog, éénbenig neerzakken (langzaam 3–4 sec) — 3x 15 herh. • Unilaterale kuitverhef op vlak (concentrisch + excentrisch): 3x 12–15 herh. per been • Stap-ups op lage verhoging (15 cm): 3x 12 herh. per been — op middelvoet landen • Single-leg balance op onstabiel oppervlak: 3x 45 sec per been • Enkelmobilisatie: rondjes draaien, alfabet schrijven met voet, 2x per dag • Rustig joggen op gras met hiellift: 2x 10 min bij pijn ≤2/10
Aandachtspunten	• Excentrische heel raise is de SLEUTELINTERVENTIE: gecontroleerd en bewust uitvoeren • Lichte pijn (≤3/10) tijdens excentrische oefening is acceptabel — daarna moet pijn binnen 24 uur verdwijnen • Pas intensiteit aan op basis van dagelijkse pijnscore: bij >3/10 terugschalen • Hiellift blijft in schoenen tijdens alle activiteiten

Fase 4 | Functioneel loopherstel — Week 3–4

Doel	Sportspecifiek lopen en richtingsveranderingen herstellen, hakbelasting opbouwen.
Oefeningen	• Loopdrills: marshloop, hakloop, knieheffen — op middelvoet, rustig tempo • Versnellen en uitlopen op gras: 5x 20–30 m, geleidelijk intensiveren • Laterale stap-oefeningen met weerstandsband (enkel): 3x 15 • Lage sprongoefening: dubbelbenig afzetten en zacht landen — 3x 8 herh. • Passing met beide voeten op gras: 15–20 min • Excentrisch onderhoud: heel raise op traptree 3x/week • Enkelvoudige balans met oogdicht: 3x 30 sec per been
Aandachtspunten	• Eerste voetbalcontact: alleen passing op vlak gras — geen intensieve sprints of duels • Let op looppatroon: middelvoets landingspatroon aanleren indien hardlopen op hiel • Tapen van de enkel/hak kan extra steun geven bij eerste voetbalbelasting • Na elke sessie: ijs 15 min op hak

Fase 5 | Voetbalspecifiek herstel — Week 4–5

Doel	Integratie in teamtraining, sprintbelasting en schietoefeningen opbouwen.
-------------	---

Oefeningen	• Gedeeltelijke teamtraining: eerste 30–45 min zonder intensieve duels en maximale sprints • Dribbelen, passing en positiespelen op klein veld • Schietoefeningen: start met gecontroleerde schoten, opbouwen naar vol schot • Sprinttraining: 5x 20 m met volledige inspanning bij pijn $\leq 2/10$ • Sprong oefeningen: dubbelbenig opzetten, éénbenig bij pijn $\leq 2/10$ • Excentrisch onderhoud: 2x/week heel raise programma voortzetten
Aandachtspunten	• Trainer informeren: speler mag deelnemen aan loopvormen en passing, nog geen maximale sprints • Hiellift actief houden in voetbalschoenen — overweeg inlegzool op maat • Dagelijkse pijnscore bijhouden; wekelijks evalueren met sportverzorger

Fase 6 Volledige terugkeer naar het team — Week 5–6	
Doel	Volledig wedstrijd niveau hervatten, terugval voorkomen met preventief programma.
Oefeningen	• Volledige teamtraining inclusief duels, intensieve sprints en sprongen • Wedstrijddeelname: start met 45–60 min, opbouwen naar 90 min • Excentrisch onderhoudsprogramma 2x/week (ook buiten trainingdagen) • Zelfstandige kuitstretch- en mobiliteitssroutine na elke training/wedstrijd • Hiellift naar eigen voorkeur — preventief aanhouden bij klachtenvrije periodes
Aandachtspunten	• Evaluer na eerste wedstrijd: klachtenvrij? Dan volledig groen licht. • Bij terugkerende hakpijn na training: direct contact sportverzorger — niet zelf doorlopen • Preventief programma minimaal 6 weken na terugkeer voortzetten • Controleer schoeisel: slijtage verhoogt hakbelasting aanzienlijk

Criteria voor terugkeer naar volledige training (Return to Play)

De speler is klaar voor volledige wedstrijd deelname wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

✓ Pijn	Pijnscore $\leq 1/10$ bij wandelen, joggen, springen én na de training (volgende ochtend)
✓ Kracht	Unilateraal kuitverhef 3x15 pijnvrij; geen krachtverschil $> 10\%$ tussen linker en rechter
✓ Functie	Eénbenige sprong, shuttle run en hielstoot-test pijnvrij en symmetrisch uitvoerbaar
✓ Training	Minimaal twee volledige trainingen inclusief sprints en sprongen pijnvrij afgerond
✓ Speler/ouder	Speler en ouders voelen zich klaar; geen belastingsangst bij hardlopen of springen

Schoeisel, hulpmiddelen en aanpassingen

Hiellift

Een hiellift van 5–10 mm in beide schoenen vermindert direct de trekkracht van de achillespees op de groeischijf. Gebruik in alle schoenen (voetbalschoenen, gympen, schoolschoenen). Bij langdurige klachten: overweeg een maatinlegzool bij een orthopedist of podoloog.

Schoeisel voetbalschoenen

- Kies voetbalschoenen met goede hielomhulling en enige hakverhoging
- Vermijd vlakke zolen (zaalvoetbalschoenen) tijdens de acute fase
- Controleer regelmatig de slijtage van de zool — een versleten schoen verhoogt de hakbelasting

Taping

- Laag-dye taping of hak-taping kan de pijn bij training verminderen
- Achillespees-taping (losse wikkeling) vermindert de dynamische belasting bij afzet

Preventie na terugkeer

- Dagelijks kuitstretching beide spieren — minimaal 10 min na elke training
- Excentrisch kuitprogramma 2x per week als onderhoud (ook in klachtenvrije periodes)
- Belastingopbouw bewaken: maximaal 10% volume- of intensiteitsverhoging per week
- Schoeisel regelmatig controleren en tijdig vervangen
- Bij groeisput: tijdelijk trainingsvolume verlagen en stretchfrequentie verhogen
- Bij eerste tekenen van hakpijn: direct contact sportverzorger en belasting aanpassen

Opgesteld door Sportverzorging jeugd vv Bennekom | Dit programma is een richtlijn en vervangt geen individueel medisch advies | Seizoen 2025–2026